









# 頭頸部がんグループ：

## 中下咽頭・喉頭がん 治療開発マップ 2017.9.

Stage 切除可能・不能	標準治療		JCOG試験	他組織の試験	適応外薬
Stage I	単純切除 				
Stage II	機能温存手術 	放射線療法			
切除可能 Stage III Stage IVA Stage IVB	根治手術再建術 ±術後補助化学 放射線療法 (シスプラチン +放射線療法) 	 シスプラチン 併用化学放射 線療法	導入化学療法 (TPF療法) <sup>1)</sup>	<b>JCOG1008</b> 術後ハイリスク 放射線療法+シスプラチン q3w vs. weekly 2012.10~ 	初回治療 免疫チェックポイント 阻害薬 企業治験 (CRT±PD-L1)
切除不能 Stage III Stage IVA Stage IVB					
Stage IVC	化学療法 1 <sup>st</sup> line シスプラチン/5FU+ セツキシマブ 	化学療法 2 <sup>nd</sup> line (プラチナ不応) ニボルマブ 		1 <sup>st</sup> line 免疫チェックポイント阻 害薬 企業治験 (KESTREL, KEYNOTE- 048, CheckMate 651)	MTX <sup>2)</sup>
再発					

1) 導入化学療法TPF（ドセタキセル、シスプラチン、5FU）は、機能温存を希望する切除可能患者の標準治療の一つ(ESMOガイドラインでは推奨度A)

2) MTX: メトトレキサート