

# リンパ腫グループ：ホジキンリンパ腫 治療開発マップ

2018.03.

対象	標準治療	JCOG試験	他組織の試験	主な承認薬 / 適応外薬
<b>限局期</b> 臨床病期 I 縦隔バルキー病変なし 臨床病期 II	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 45%;">           ABVD(4コース)            +領域照射(30 Gy)   </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 45%;">           予後不良因子なし            ABVD(2コース)            +領域照射(20 Gy)の選択も可能   </div> </div>			
<b>進行期</b> 縦隔バルキー病変あり 臨床病期II  臨床病期 III 臨床病期 IV	ABVD (6, 8コース) 部分奏効例では、 残存部位に照射(30Gy)を追加 	<b>JCOG1305</b> ABVDによる寛解導入 中間 PET陰性群→ABVD療法継続 中間 PET陽性群→増量BEACOPP 2015.11～ 	AVD+BV vs. ABVD 国際共同第III相試験 (ECHELON-1, Takeda) NCT01712490	BV
<b>再発</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 45%; background-color: #ffe0e0;">           65歳以下            救援化学療法および            自家末梢血幹細胞移植            併用大量化学療法         </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 45%; background-color: #fff9c4;">           66歳以上            救援化学療法   </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px; width: 45%; text-align: center;">BV</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 45%; background-color: #fff9c4;">           ニボルマブ、            ペンブロリズマブ         </div> </div>		BV vs. ペンブロリズマブ 国際共同第III相試験 (MSD) NCT02684292	

ABVD (ドキシソルピシン、ブレオマイシン、ビンブラスチン、ダカルバジン)

BEACOPP (ブレオマイシン、エトポシド、ドキシソルピシン、シクロホスファミド、ピンクリスチン、プロカルバジン、プレドニゾン)

BV (ブレンツキシマブ・ベドチン)

領域照射療法：治療前に病変があった領域のみに照射する方法

中間 PET：治療中間でのPETによる画像診断

救援化学療法：初回治療後の再発または治療抵抗性患者に対して行う化学療法

予後不良因子：縦隔バルキー病変の存在、節外病変の存在、血沈亢進（B症状なしの場合  $\geq 50\text{mm}/\text{時間}$ 、B症状ありの場合  $\geq 30\text{mm}/\text{時間}$ ）、3カ所以上の病変の存在。