






リンパ腫グループ：ホジキンリンパ腫 治療開発マップ

2017.01.

対象	標準治療	JCOG試験	他組織の試験	適応外薬
限局期 臨床病期 I 縦隔バルキー病変なし 臨床病期 II	ABVD(4コース) +領域照射(30 Gy) 	予後不良因子なし ABVD(2コース) +領域照射(20 Gy)の選 択も可能 		
進行期 縦隔バルキー病変あり 臨床病期II 臨床病期 III 臨床病期 IV	ABVD (6, 8コース) 部分奏効例では、 残存部位に照射(30Gy)を追加 	<div style="border: 2px solid orange; border-radius: 15px; padding: 10px;"> JCOG1305 ABVDによる寛解導入 中間 PET陰性群→ABVD療法継続 中間 PET陽性群→増量BEACOPP 2015.11～  </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;"> ABVD vs. BV+ AVD 国際共同第III相試験 (武田薬品) NCT01712490 </div>	
再発	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid pink; border-radius: 5px; padding: 5px; width: 45%;"> 65歳以下 救援化学療法および 自家末梢血幹細胞移植 併用大量化学療法 </div> <div style="border: 1px solid yellow; border-radius: 5px; padding: 5px; width: 45%;"> 66歳以上 救援化学療法  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid yellow; border-radius: 5px; padding: 5px; width: 45%; text-align: center;"> BV </div> <div style="border: 1px solid yellow; border-radius: 5px; padding: 5px; width: 45%; text-align: center;"> ニボルマブ </div> </div>		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;"> ペンブロリズマブ 第II相試験 (MSD) </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-top: 5px;"> BV vs. ペンブロリズマブ 国際共同第III相試験 (MSD) NCT02684292 </div>	

ABVD (ドキシソルピシン、ブレオマイシン、ビンブラスチン、ダカルバジン)

BEACOPP (ブレオマイシン、エトポシド、ドキシソルピシン、シクロホスファミド、ビンクリスチン、プロカルバジン、プレドニゾン)

BV (プレントキシマブ・ベドチン)

領域照射療法：治療前に病変があった領域のみに照射する方法

中間 PET：治療中間でのPETによる画像診断

救援化学療法：初回治療後の再発または治療抵抗性患者に対して行う化学療法

予後不良因子：縦隔バルキー病変の存在、節外病変の存在、血沈亢進 (B症状なしの場合 ≥50mm/時間、B症状ありの場合 ≥30mm/時間)、3カ所以上の病変の存在。